

# ファインケム・PS・乳剤

木材用防虫剤 普通物

10L

適用樹種 : スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、その他の針葉樹及び広葉樹等の丸太、板材、角材。  
土壌用防虫剤としても使用可能です。

適用害虫 : シロアリ、キクイムシ類、ゾウムシ類、カミキリムシ類 等の穿孔性害虫。

## 特長

有効成分 : スミチオン・有機溶剤・乳化剤等

製品形態 : 黄淡褐色透明液体で、水で薄めると容易に、乳白色の乳化液となります。

特性 : \*スミチオン主成分で、有機リン系殺虫剤で唯一、低毒性で安全性の高い薬剤で、普通物です。

\*本剤は、穿孔虫類、シロアリ、等巾広い強力な殺虫効果を持ち、特殊乳化剤の働きで、木材内部迄深達し、長期間残留効果を持続する理想的な薬剤です。

## 使用方法

希釈倍数 : 20倍～40倍(原液1対19～39)。

塗布方法 : 背負式自動噴霧機、動力噴霧機、その他の用具等で(表面積1㎡当り300～600cc)を噴霧機又は塗布して下さい。

## 注意事項

- \* 残った薬液の廃棄は、土壌中に染み込ませないようにし、河川や池などに捨てないようにして下さい。取扱は、必ず保護具を着用して下さい。
- \* アルカリ性の混用は避けて下さい。火気は、避けて下さい。
- \* 貯蔵は、鍵のかかる冷暗所に、密閉して保管して下さい。
- \* 誤って、処理液が眼に入った場合は、直ちによく水洗いし、医師の手当てを受けて下さい。原液が皮膚に付いた時は、直ちに石鹼で洗い流して下さい。
- \* 作業は、出来るだけ風上でし、噴霧蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- \* 作業中、頭痛やめまいがしたり、吐気がした時は、速やかに医師の手当てを受けて下さい。解毒剤として、硫酸アトロピン又は、パムが有効です。
- ★ 化学物質の有害性については、予見出来ない事が有り、取り扱いには細心の注意を払って下さい。
- ★ 本品の適正な使用に就いては、使用者の責任において行って下さい。

取扱い又は使用に際し、安全データシート【SDS】を必ずお読みください。