

4. 園内の衛生管理
室内

居室	テーブル等	テーブル等は汚れを除去し、アルコール消毒する。 また、食事前には毎回アルコール消毒を行う。
	床	園児の帰宅後に、掃除機をかけ、雑巾で水拭きする。
	高濃度接触部位	1日1回高濃度接触部位はアルコールにて消毒する。※感染流行時、11月～4月までは次亜塩素酸ナトリウム0.02%で消毒を行う。
	尿汚染	尿汚染を除去後、水拭きした後、アルコールにて消毒する。
	便汚染	便汚染を除去後、次亜塩素酸ナトリウムで浸漬し拭き取る。
	嘔吐汚染	別紙参照1
	嘔吐下痢症発生時の清掃に関して、別紙参照2	
玩具	ぬいぐるみ、布類	定期的に洗濯し、天日干しする
	洗えるもの	使用後は、流水で洗い流し乾燥させる。
	洗えないもの	使用後は、次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、完全に乾燥させる。
ベッド、シャワーなど	ベッド・寝具等	週末に家族に持って帰ってもらい、洗濯し、天日干すように依頼する。
	シャワーパン、浴槽	使用後は水洗いし汚れを除去する。週1回バスマジックリンで清掃する。
トイレ	便器・汚染槽、蛇口、水回り、床、窓、棚、トイレ用サンダル	日々の清掃にて清潔に保つ。 便器はトイレ洗浄剤にて清掃し、便器はトイレクリーナーと次亜塩素酸ナトリウム0.02%で清潔に保つ。
	ドア、ドアノブ手すり、照明のスイッチ等	水拭きした後、アルコールにて消毒を行う。 ※ノロウイルス感染症が流行している場合には次亜塩素酸ナトリウム0.02%にて清潔を保つ。
	オムツ用バケツ	週1回(土曜日)バケツの外側、内側、ふたを消毒液で拭く。 毎日ふたを消毒液で拭く。
その他	エアコン	エアコンはフィルター掃除を半年に1回行う。

」